

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 7 - 4 - 71 170419

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 1 au Bulletin n° 127 du mois d'Avril 1971

6 Avril 1971

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURE DU POMMIER

Le relèvement très sensible des températures maximales, enregistré depuis le 30 Mars dernier, est à l'origine d'un départ végétatif très rapide des arbres fruitiers. Sur la plupart des variétés de pommiers, le passage entre le stade C à C3 a été atteint en moins de deux jours dans de nombreux vergers. Les températures actuelles devant se maintenir au cours des prochains jours, le stade D va être rapidement atteint.

Les contrôles journaliers de maturité des périthèces (organes de conservation du champignon) mettent en évidence que des projections d'ascospores importantes, se produiront lors des prochaines pluies et seront à l'origine des premières contaminations primaires. En conséquence, nous recommandons aux arboriculteurs, d'effectuer un premier traitement fongicide avant le 10 Avril. Ce premier traitement devra être réalisé avec beaucoup de soin, en particulier dans les vergers fortement infestés l'an dernier.

TAVELURE DU POIRIER

Renouveler le traitement sur toutes les variétés arrivant au stade D3.

OÏDIUM DU POMMIER

Les conditions climatiques étant actuellement très favorables au développement de l'Oïdium, profiter du traitement Tavelure, pour faire un traitement mixte. Pour le choix des produits, se reporter à la liste en votre possession (rubrique Tavelure et Oïdium des arbres fruitiers).

PUCERONS VERTS DU POMMIER

Les premières éclosions de Pucerons verts sont notées depuis le 2 Avril. Des colonies parfois importantes se sont installées sur les bourgeons dès le stade C3. Nous rendons nos abonnés attentifs à ce problème.

Dans bien des cas, il serait prudent d'ajouter un produit aphicide à la bouillie Tavelure - Oïdium, pour détruire ces premières colonies qui, si elles ne sont pas combattues, risquent d'avoir des conséquences fâcheuses sur les inflorescences en formation.

PSYLLES DU POIRIER

Ces ravageurs sont également très actifs sur poirier. Après reconnaissance du parasite, effectuer un traitement avec un Oléoparathion apportant 25 g de M.A./hl ou avec un Lindane en émulsion apportant 35 g de M.A./hl.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 3 au Bulletin N° 126 publié en date du 30 Mars 1971